



# SYSTEEMTHERAPIE BIJ COLONCARCINOOM

M. CHALABI, INTERNIST-ONCOLOOG



---

# CASUS 1

---

67-jarige man met een gemetastaseerd rectumcarcinoom

VG:

- 2015: T3N0 rectumcarcinoom waarvoor low anterior resectie
- 08-2017: naar de lever, longen en skelet gemetastaseerd rectumcarcinoom met uitgebreid lokaal recidief
- 09-2017: start 1e lijns chemotherapie met capecitabine/oxaliplatin/bevacizumab
- 11-2017: evaluatie na 3 kuren: stabiele ziekte, redelijke tolerantie
- 01-2018 (wissel hoofdbehandelaar) evaluatie na 6 kuren: progressieve ziekte, veel rugpijn met uitstraling naar been → palliatieve radiotherapie

**En nu?**

---

# CASUS 1 – VERVOLG

---

- Opties:
  - 2e lijns chemotherapie met irinotecan (KRASmt tumor, dus EGFR-remming geen optie)
  - Niets doen
  
- Twijfel bij hoofdbehandelaar:
  - Lijkt behandeling en afspraken niet helemaal te begrijpen (echtgenote ook niet)
  - Geheugenproblemen → eerder geriatrische assessment, waarschijnlijk door opiaten, na afbouw verbeterd
  - Bespreking met verpleegkundig specialist: “niet-pluis” gevoel
  - Echter wel altijd alle afspraken nagekomen
  
- Patient heeft een sterke behandelwens en geen harde contra-indicatie voor chemotherapie

**En nu?**

---

---

# CASUS 2

---

- 74-jarige man met een peritoneaal gemetastaseerd coloncarcinoom

VG:

- 01-2016: cT4bN2 groot coloncarcinoom met ingroei in omgeving waarvoor neoadjuvant chemotherapie
- 05-2016: subtotale colectomie met en bloc verwijderen deel grote curvatuur maag, omentum, 20cm distale jejunum: PA: ypT4bN2, wel regressie op chemotherapie
- 07-2016: start adjuvante chemotherapie 4 kuren capecitabine/oxaliplatin (stop ivm polyneuropathie)
- 
- 11-2016: peritoneaal gemetastaseerd coloncarcinoom , redelijke algehele conditie

---

# CASUS 2

---

- Opties:
  - 2de lijns systeemtherapie → irinotecan of panitumumab (geen mutaties)
  - Niets doen
- Behandelwens, voelt zich nog prima
  - Start panitumumab (wil geen irinotecan ivm haaruitval en meer toxiciteit)
- 6 weken na start irinotecan: opname ivm braken, eten/drinken lukt niet meer, WHO PS 2, 8kg gewichtsverlies
  - CT: sterke progressie alle peritoneale metastasen en lymfadenopathie, nieuwe metastasen, compressie duodenum

## Wat zou u doen?

- **Sondevoeding, fysiotherapie**
- **MSI coloncarcinoom → start immuuntherapie in studieverband**

## CASUS 2

- Klinisch na 2 kuren (4 weken!) clinical benefit
- Sonde uit
- Nu 15mnd on treatment + PR

