



BRACHYTHERAPIE BIJ BAARMOEDERKANKER

De behandeling van baarmoederkanker of endometriumcarcinoom bestaat uit een operatie waarbij de baarmoeder en de eierstokken worden verwijderd. Nadat de patholoog het weggehaalde weefsel beoordeeld heeft kan een nabestraling nodig zijn in de vorm van een inwendige bestraling. Deze behandeling heeft als doel om de kansen dat de tumor op de top van de vagina terugkomt te verkleinen.

Inwendige bestraling wordt ook wel brachytherapie genoemd. Het grote voordeel van een inwendige bestraling is dat er heel lokaal een hoge dosis straling gegeven kan worden en dat het gezonde weefsel minder wordt belast, waardoor er minder bijwerkingen zijn.

Als uw behandeling bestaat uit alleen een inwendige bestraling zal dit in drie keer gebeuren. Bij een combinatie van een uitwendige bestraling en een inwendige bestraling, krijgt u twee maal een inwendige bestraling. De inwendige bestralingen worden met tussenpozen van drie tot zeven dagen gegeven.

Bij een inwendige bestraling wordt de bovenste (diepst gelegen) helft van de vagina van binnenuit bestraald. Hiervoor wordt er een op uw maat aangepaste gladde cilinder in de vagina ingebracht. Deze cilinder wordt tevoren met gel ingesmeerd, zodat het inbrengen gemakkelijk gaat. De bestralingsbron kan via de smalle buis worden ingebracht, precies op de plek waar de bestraling gegeven moet worden. De inwendige bestraling zal ongeveer 10 minuten duren. U voelt van de bestraling niets. De straling verdwijnt direct als het toestel is uitgeschakeld. Anderen in uw omgeving zullen zodoende geen straling ontvangen. Daarna wordt de cilinder verwijderd en kunt u naar huis gaan.

Ter voorbereiding op deze behandeling wordt er een afspraak gemaakt om de juiste cilindermaat te bepalen en om een nieuwe CT-scan met ingebrachte cilinder van het bekkengebied te maken. Hiermee worden berekeningen gemaakt voor de bestraling. Een aantal dagen later start de eerste inwendige bestraling.

Doorgaans zijn er weinig tot geen klachten na de inwendige bestraling. Soms is het plassen een tot enkele dagen wat gevoelig, en kunt u wat meer aandrang voor plassen en ontlasting hebben. Er kan licht bloedverlies optreden gedurende één tot enkele dagen; dit gaat vanzelf over. Daarnaast kunt u kortdurend last hebben van lichte vermoeidheid.

Door de gegeven bestraling kan het bovenste deel van de vagina van binnen geleidelijk wat droger en wat stugger worden dan tevoren (ongeveer bij 25% van de vrouwen), en in zeldzame gevallen ook wat nauwer of korter. Na afloop van de behandeling wordt aan u uitgelegd wat u kunt doen ter preventie hiervan.

Als u vragen heeft kunt u ons bellen op telefoonnummer 020 512 9111.