



BRACHYTHERAPIE BIJ BAARMOEDERHALSKANKER

De behandeling van baarmoederhalskanker of cervixcarcinoom bestaat uit een combinatie van uitwendige en inwendige bestraling. Inwendige bestraling wordt ook wel brachytherapie genoemd. Het grote voordeel van brachytherapie is dat er heel lokaal een hoge dosis straling op de tumor gegeven kan worden waarbij gezond weefsel minder wordt belast. Hierdoor zullen er minder bijwerkingen zijn.

Brachytherapie wordt gegeven via een applicator die in de vagina en de baarmoeder wordt geplaatst. Deze applicator wordt aan een bestralingsbron gekoppeld. Meestal wordt er drie keer een inwendige bestraling gegeven. De eerste keer zal doorgaans in de vijfde week van de uitwendige bestraling zijn. De tweede inwendige bestraling volgt een week daarna, en de derde weer een week later.

Voor de brachytherapie is een dagopname nodig in het ziekenhuis. U wordt vroeg in de ochtend nuchter op de verpleegafdeling verwacht. De verpleegkundigen bereiden u voor om naar de operatiekamer te gaan waar de applicator wordt ingebracht. Vaak krijgt u algehele narcose.

In de operatiekamer ziet u uw behandelelaar, een anesthesioloog en de brachylaboranten.

Als u onder narcose bent, wordt de applicator ingebracht via de vagina in de baarmoeder. U krijgt een infuus (voor vochttoediening en medicatie) en een urinekatheter (voor afvoer van de urine). De gehele procedure op de operatiekamer zal ongeveer 45 minuten duren.

Zodra de narcose is uitgewerkt en u wakker bent, wordt u opgehaald door de brachylaboranten om naar de MRI-scanner te gaan. Een MRI wordt gemaakt om het bestralingsplan te kunnen berekenen.

U wordt teruggebracht naar de afdeling. De applicator moet goed op zijn plaats blijven, en wordt daarom met huidvriendelijke tape aan uw benen op zijn plaats gehouden. Blijft u vooral rustig op uw rug liggen. Mocht u pijn voelen, dan kunt u om medicatie vragen. Als de berekeningen voor de bestraling klaar zijn, wordt u opgehaald. Dit zal in de middag zijn.

Op de brachybehandelkamer wordt de bestraling gegeven. De bestraling zal ongeveer tien minuten duren. U voelt hier niets van, wel hoort u verschillende geluiden.

Na de bestraling verwijdert de brachylaborant de urinekatheter en de applicator.

U wordt teruggebracht naar de afdeling. Als u geplast heeft en zich goed voelt, dan mag u in overleg met de verpleegkundige naar huis. Meestal is dit in de late middag of de vroege avond.

Het kan zijn dat u van de brachytherapie bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen van de brachytherapie kunnen bestaan uit vaginale irritatie of pijn en vaginaal bloedverlies. Het kan zijn dat er plasklachten ontstaan, zoals pijn bij het plassen of vaak moeten plassen. U kunt zich moe voelen na de behandeling.

Na de behandeling is er geen straling meer in uw lichaam en bent u veilig voor uw omgeving.

Naast deze informatie krijgt u ook een voorlichtingsgesprek met een van onze brachylaboranten. Dit gesprek vindt één tot twee weken voorafgaand aan de eerste brachytherapie plaats. In dit gesprek zal alles nog een keer rustig uitgelegd worden en is er ruimte voor vragen. Daarnaast krijgt u voorafgaand aan de behandeling ook een gesprek met een anesthesioloog. Deze bespreekt de narcose met u. Na dit gesprek wordt u gebeld door de afdeling Patiëntenlogistiek die aan u doorgeeft wanneer en waar u zich moet melden, en vanaf hoe laat u niet meer mag eten of drinken.

Als u vragen heeft kunt u ons bellen op telefoonnummer 020 512 9111.