

SARCOMEN

1.175

Mensen kregen in 2018 de diagnose sarcoom.

MEER DAN 50

soorten sarcomen bestaan er. De meest voorkomende: **GIST** (Gastro Intestinale Stroma Tumoren; een kwaadaardige tumor uit de bindweefsellaag van het maagdarmsstelsel), **LMS** (Leiomyosarcoom; een kwaadaardige tumor van gladde spiercellen, onder andere voorkomend in de baarmoeder, de huid en de bloedvaten), **LPS** (Liposarcoom; kwaadaardige tumor van vetcellen), **UPS** (Undifferentiated Pleiomorphic Sarcoma, oftewel: ongedifferentieerd pleiomorf sarcoom; een zeldzame, kwaadaardige tumor in het bot of in bindweefsel).

CHEMOSPOELING

Geïsoleerde ledemaatperfusie is in het Antoni van Leeuwenhoek een reguliere behandeling, waarbij een hoge dosis chemotherapie door het been of de arm wordt gespoeld. Deze behandeling kan bij een sarcoom in been of arm een amputatie voorkomen.

Sarcomen zijn kankersoorten die ontstaan vanuit het steunen bindweefsel en daarom ook wel weke-delen-kanker worden genoemd. Het Antoni van Leeuwenhoek is een van de weinige expertisecentra in Nederland voor de behandeling van sarcomen.

Sarcomen kunnen voorkomen in spieren, zenuwen, vet, bloedvaten, kraakbeen en het weefsel tussen organen. Er zijn sarcomen die snel en agressief uitzaaien en soorten die langzaam groeien en niet of nauwelijks uitzaaien. Sarcomen komen voor op alle leeftijden, dus ook op jonge leeftijd, met een piek rond de leeftijd van 50-60 jaar. Waarvoor sarcomen ontstaan is onbekend. Soms spelen (zeldzame) erfelijke aandoeningen een rol. Meestal geven

ze pas in een laat stadium klachten, omdat ze, tussen andere weefsels gelegen, vaak pas laat druk op organen, bloedvaten of zenuwen geven. Bij minder diep gelegen sarcomen is de meest voorkomende klacht een zwelling of bult die groeit. Het stellen van een diagnose kan bij sarcomen langer duren dan bij andere kankersoorten. Dit komt door een enorme variatie in subtypes en de verschillende plekken in het lichaam waar sarcomen voorkomen.



‘Omdat sarcomen zó verschillend zijn, brengen we de precieze mutatie in kaart en is onze behandeling echt op de persoon aangepast’

Dr. Winan van Houdt,
chirurg-oncoloog

DE BEHANDELING

bestaat uit chirurgie, radiotherapie en behandeling met medicatie (targeted therapie en chemotherapie), maar verschilt erg per sarcoomtype.

PATIËNTEVREDENHEID

Hoe waarderen patiënten met sarcomen de zorg van het Antoni van Leeuwenhoek?



Totaalcijfer
over 2017:

8.5

EERSTE AFSPRAAK

Die kan vaak binnen 1 week worden gemaakt. De start van een eventuele behandeling volgt na 1 tot 4 weken.

1 WEEK

Is ongeveer de wachttijd voor een second opinion.

Meer info over sarcomen, behandelmethodes, wachttijden en resultaten? Kijk op: avl.nl/kankersoorten/sarcomen